

tidpunkt	undersökning	mål	utfört
nyfödd + första månad	<p>På BB/neonatalavd: Initialt föräldraromhändertagande med kurator och PAL. FISH/kromosomanalys. Information om DS. Hb, Vita+diff, Trc .</p> <p>Kardiologisk screening/ UKG.</p> <p>Remiss ögonläkare.</p> <p>Remiss öronläkare.</p> <p>Remiss habilitering.</p> <p>Efter hemgång: Kontakt habilitering. Besök hos PAL efter behov. Etablera kontakt med BVC.</p>	<p>Tas vid misstanke om TMD.</p> <p>Medfödd hjärtfel/Pulmonell hypertension? Vid avvikelse fortsatt individuell uppföljning. Kongenital katarakt?, uppföljning. Hörseldiagnostik, uppföljning.</p> <p>Kurator, sjukgymnast, logoped.</p> <p>Långsiktigt arbete av hab.team – i samarbete med PAL.</p>	
3 månader ålder	<p>Besök hos PAL. Tillväxt? Ätande/aspiration?</p>	<p>Down-specifik kurva Behov av dietist? Sond?</p>	
6 månader ålder	<p>Besök hos PAL. Tillväxt, nutrition? Ätande/aspiration? Obstipation/GERD?</p> <p>OSAS-symtom?</p> <p>Öronundersökning, hörseltest vid misstanke om hörselnedsättning. Remiss Tandvård.</p>	<p>Behov av dietist? Behov av gastrostomi? Hirschsprungs sjukdom? Remiss barnkirurg? Remiss för andningsregistrering? Informera om öron/hörselproblem. SOM? Behov av rör/hörapparat? Information tandsprickning och munvård.</p>	
1år	<p>Besök hos PAL. fT4, TSH. Om patologiska: TPO, TG Fortsatt med årliga kontroller. Mun/tandhälsa?</p> <p>HLA DQ2/DQ8 Om patologiska: S-IgA, TGA Vid Ig-A brist: Gliadin-IgG. Sömn/OSAS symtom?</p> <p>Ögon- och synundersökning.</p> <p>Öron- och hörselundersökning.</p>	<p>Hypotyreos?</p> <p>Etablerad kontakt med tandvård? Celiaki? Vid HLA-prov neg, ingen ytterligare provtagning. Remiss barn gastroenterolog?</p> <p>Remiss för andningsregistrering? Brytningsfel/skelning/ackomodation. Behov av glasögon? Hörselnedsättning/SOM, se ovan. Vid normalt hörsel/öronstatus på</p>	

tidpunkt	undersökning	mål	utfört
		båda öronen- årliga kontroller.	
2år	Besök hos PAL.  Om positiv DQ2/DQ8 vid 1 år ska TGA tas. Ögon- och synundersökning.  Öron- och hörselundersökning.	Se besök PAL 1 år.  Celiaci? Remiss till barn gastroenterolog?  Brytningsfel/skelning/ackomodation. Behov av glasögon? Hörselnedsättning/SOM, se ovan. Vid normalt hörsel/öronstatus på båda öronen- årliga kontroller.	
3år	Besök hos PAL. Autismscreening.  Tandvård. Öron- och hörselundersökning.	Se besök PAL 1 år. Överväg autismutredning enligt rutiner. Senast 1:a besök. Hörselnedsättning/SOM, se ovan. Vid normalt hörsel/öronstatus på båda öronen- årliga kontroller.	
4år	Besök hos PAL.  Nattlig andningsregistrering Ögonundersökning.  Öron- och hörselundersökning.	Se besök PAL 1 år.  Remiss om ej utfört tidigare.  Brytningsfel/skelning/ackomodation/keratokonus. Behov av glasögon? Hörselnedsättning/SOM, se ovan. Vid normalt hörsel/öronstatus på båda öronen- årliga kontroller.	
5år	Besök hos PAL. ADHD-symtom?  Om positiv DQ2/DQ8 vid 1 år ska TGA tas. Öron- och hörselundersökning.	Se besök PAL 1 år. SNAP-IV formulär, ev utredning enligt rutiner. Celiaci? Remiss till barn gastroenterolog? Hörselnedsättning/SOM, se ovan. Vid normalt hörsel/öronstatus på	

tidpunkt	undersökning	mål	utfört
		båda öronen- årliga kontroller.	
6år	Besök hos PAL.  Utvecklingsbedömning  Ögonundersökning.  Öron- och hörselundersökning.	Se besök PAL 1 år.  Inför skolstart, av psykolog.  Brytningsfel/skelning/ackomodation/keratokonus. Behov av glasögon? Hörselnedsättning/SOM, se ovan. Vid normalt hörsel/öronstatus på båda öronen- årliga kontroller.	
7år	Besök hos PAL. Höftsmärta/instabilitet/hälta? Öron- och hörselundersökning.	Se besök PAL 1 år. Höftledsluxation/Perthes? Ev röntgen, remiss barnortoped. Hörselnedsättning/SOM, se ovan. Vid normalt hörsel/öronstatus på båda öronen- årliga kontroller.	
8år	Besök hos PAL.  Ögonundersökning.  Tandvård - Röntgen av tänder för anlagsbestämning.	Se besök PAL 1 år.  Brytningsfel/skelning/ackomodation/keratokonus. Behov av glasögon? Parodontit? - profylax och behandling. Tandutveckling?	
9år	ft4, TSH.	Hypotyreos?, se ovan. Ev besök hos PAL.	
10år	Besök hos PAL. Samtal pubertet.  Ögon- och synundersökning.  Öron- och hörselundersökning  Om positiv DQ2/DQ8 vid 1 år ska TGA tas.	Se besök PAL 1 år. Menstruation/preventivmedel.  Brytningsfel/skelning/ackomodation/keratokonus. Behov av glasögon? Hörselnedsättning/SOM, se ovan. Vid normalt hörsel/öronstatus på båda öronen- årliga kontroller. Celiaci? Remiss till barn gastroenterolog?	
11år	ft4, TSH.	Hypotyreos?, se ovan. Ev besök hos PAL.	

tidpunkt	undersökning	mål	utfört
12år	Besök hos PAL. Depression?	Se besök PAL 1 år. Ev remiss barnpsykiatri	
13år	ft4, TSH.  Ögon- och synundersökning. Öron- och hörselundersökning.	Hypotyreos?, se ovan. Ev besök hos PAL.  Ackomodation/keratokonus/katarakt? Hörselnedsättning/SOM, se ovan. Vid normalt hörsel/öronstatus på båda öronen- årliga kontroller.	
14år	Besök hos PAL.	Se besök PAL 1 år.	
15år	ft4, TSH.  Öron- och hörselundersökning.	Hypotyreos?, se ovan. Ev besök hos PAL. Hörselnedsättning/SOM, se ovan. Vid normalt hörsel/öronstatus på båda öronen- årliga kontroller.	
16år	Besök hos PAL. Ögon- och synundersökning.  Om positiv DQ2/DQ8 vid 1 år ska TGA tas.	Se besök PAL 1 år. Ackomodation/keratokonus/katarakt? Härefter kontroll var tredje år till 25 år. Celiaci? Remiss till barn gastroenterolog?	
17år	ft4, TSH.	Hypotyreos?, se ovan. Ev besök hos PAL.	
18år	Besök hos PAL. Överföra till vuxensidan. Öron- och hörselundersökning.	Se besök PAL 1 år.  Hörselnedsättning/SOM, se ovan. Vid normalt hörsel/öronstatus på båda öronen- årliga kontroller.	
Vid varje besök efterfråga	Sömn? OSAS? Mun/tandhälsa? Obstipation/GERD? Höftsmärta/instabilitet/hälta? Nacksmärta/instabilitet? Infektioner/Infektionskänslighet? ? Autism/ADHD? Behov av avlastning? Tillväxt/Ätande?	Överväg röntgen/remiss (barn-)ortoped  Behov av prophylax?	